

■ 日本病院会 (QIプロジェクト) 統計

年度指標	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
患者満足度(外来患者) 満足 (全国平均)	38.1% (41.5%)	38.7% (41.2%)	39.6% (42.2%)	39.7% (42.6%)	38.0% (45.5%)
患者満足度(外来患者) 満足またはやや満足 (全国平均)	81.5% (82.6%)	81.7% (82.8%)	82.3% (82.2%)	82.8% (82.0%)	88.0% (82.2%)
患者満足度(入院患者) 満足 (全国平均)	48.9% (59.2%)	48.9% (58.5%)	49.9% (59.1%)	49.9% (59.0%)	60.0% (61.0%)
患者満足度(入院患者) 満足またはやや満足 (全国平均)	84.4% (90.1%)	85.2% (90.2%)	86.2% (89.9%)	86.2% (89.7%)	90.3% (90.5%)
入院患者の転倒・転落発生率 (全国平均)	0.21% (0.24%)	0.21% (0.23%)	0.21% (0.24%)	0.21% (0.25%)	0.20% (0.26%)
入院患者の転倒・転落による損傷発生率(損傷レベル2以上) (全国平均)	0.14% (0.07%)	0.15% (0.07%)	0.15% (0.07%)	0.16% (0.07%)	0.19% (0.09%)
入院患者の転倒・転落による損傷発生率(損傷レベル4以上) (全国平均)	0.02% (0.03%)	0.02% (0.04%)	0.02% (0.05%)	0.02% (0.04%)	0.00% (0.05%)
65歳以上の入院患者における転倒・転落発生率 (全国平均)	0.20% (0.29%)	0.19% (0.30%)	0.20% (0.29%)	0.20% (0.29%)	0.19% (0.36%)
紹介割合 (全国平均)	69.5% (67.9%)	69.3% (68.1%)	69.3% (85.4%)	72.2% (90.9%)	75.4% (97.0%)
逆紹介割合 (全国平均)	71.9% (77.4%)	73.2% (79.2%)	48.1% (63.8%)	49.1% (65.5%)	48.0% (73.0%)
救急車・ホットラインの応需率 (全国平均)	99.2% (87.4%)	99.1% (87.1%)	99.0% (87.3%)	99.0% (86.0%)	98.3% (85.4%)
特定術式における手術開始1時間以内の予防的抗菌薬投与率 (全国平均)	67.3% (92.3%)	69.4% (92.1%)	71.6% (91.5%)	73.5% (92.1%)	93.1% (93.3%)
特定術式における術後24時間*以内の予防的抗菌薬投与停止率 (全国平均)	13.1% (38.2%)	14.2% (38.8%)	14.1% (42.3%)	14.8% (44.0%)	24.8% (60.5%)
特定術式における適切な予防的抗菌薬選択率 (全国平均)	85.2% (84.4%)	85.9% (85.4%)	86.6% (86.1%)	88.1% (87.3%)	98.9% (95.2%)
退院後4週間以内の予定外再入院割合 (全国平均)	9.2% (2.5%)	9.5% (2.5%)	3.5% (3.0%)	3.4% (3.0%)	3.0% (3.5%)
退院後7日以内の予定外再入院割合 (全国平均)		1.4% (1.1%)	1.3% (1.1%)	1.3% (1.1%)	1.0% (1.0%)
非心原性脳梗塞(TIA含む)患者の入院2日目までの抗血小板療法施行割合 (全国平均)	63.8% (59.5%)	64.0% (60.4%)	65.5% (60.1%)	66.8% (61.1%)	76.3% (75.6%)
非心原性脳梗塞(TIA含む)患者の入院中の抗血小板療法施行割合 (全国平均)	73.9% (72.9%)	75.8% (73.7%)	73.9% (71.9%)	92.7% (83.3%)	79.6% (83.9%)
脳梗塞患者のスタチン処方割合 (全国平均)	15.6% (34.0%)	18.5% (35.7%)	37.1% (50.1%)	36.5% (51.0%)	31.5% (52.6%)
脳梗塞の診断で入院した患者への入院後早期リハビリ治療実施割合 (全国平均)	72.4% (71.0%)	71.6% (71.6%)	71.0% (73.3%)	70.1% (73.8%)	63.4% (86.1%)
統合指標(Composite Measures) 【手術】 (全国平均)	55.6% (74.5%)	57.1% (75.5%)	58.2% (77.1%)	59.7% (78.3%)	72.3% (87.2%)
統合指標(Composite Measures) 【脳梗塞】 (全国平均)		59.6% (63.2%)	60.9% (63.9%)	65.5% (70.3%)	46.1% (71.9%)
1か月間・100床当たりのインシデント・アクシデント報告件数 (全国平均)	89.2件 (43.0件)	88.8件 (41.1件)	88.1件 (42.0件)	85.5件 (41.9件)	80.6件 (45.5件)
全報告中医師による報告の占める割合 (全国平均)	3.3% (3.8%)	3.3% (3.6%)	2.6% (3.7%)	2.7% (3.9%)	2.1% (4.4%)
職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率 (全国平均)	93.6% (93.1%)	94.4% (93.2%)	93.9% (92.5%)	93.6% (91.9%)	91.5% (85.9%)
糖尿病・慢性腎臓病を併存症に持つ患者への栄養管理実施割合 (全国平均)	84.5% (78.3%)	80.6% (65.6%)	81.2% (65.9%)	81.1% (66.1%)	79.8% (66.2%)
カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用時の血液培養実施率 (全国平均)	37.5% (40.0%)	37.9% (40.3%)	37.6% (40.0%)	38.5% (40.5%)	36.3% (40.8%)
カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用までの培養検査実施率 (全国平均)		75.4% (82.9%)	75.0% (83.7%)	75.6% (84.4%)	67.1% (86.8%)
血液培養検査における同日2セット以上の実施割合 (全国平均)	88.7% (65.0%)	89.4% (67.5%)	90.1% (68.1%)	90.2% (69.4%)	91.5% (74.0%)
血液培養検査における同日2セット以上の実施割合(生後28日未満) (全国平均)				2.8% (10.3%)	0.0% (11.8%)
血液培養検査における同日2セット以上の実施割合(生後28日～2歳未満) (全国平均)				1.8% (10.8%)	3.5% (10.7%)
血液培養検査における同日2セット以上の実施割合(2歳～6歳未満) (全国平均)				0.0% (13.5%)	0.0% (11.7%)
血液培養検査における同日2セット以上の実施割合(6歳以上) (全国平均)				97.0% (80.3%)	96.1% (78.4%)
脳卒中患者に対する地域連携の実施割合 (全国平均)	35.5% (13.0%)	54.1% (47.7%)	53.9% (47.1%)	63.2% (52.4%)	68.5% (63.2%)
大腿骨頸部骨折患者に対する地域連携の実施割合 (全国平均)	54.3% (23.0%)	40.0% (58.4%)	40.8% (60.9%)	57.5% (66.8%)	89.1% (79.4%)
大腿骨頸部骨折の早期手術割合 (全国平均)	51.3% (31.4%)	58.4% (33.2%)	58.9% (34.4%)	56.6% (35.2%)	52.1% (39.3%)
大腿骨転子部骨折の早期手術割合 (全国平均)	94.9% (44.0%)	93.6% (45.8%)	93.8% (46.0%)	91.5% (46.6%)	87.5% (50.7%)
シスプラチンを含むがん薬物療法後の急性期予防的制吐剤の投与割合 (全国平均)	73.0% (82.0%)	77.8% (82.8%)	81.2% (82.6%)	80.8% (83.0%)	71.0% (85.0%)
抗MRSA薬投与に対する薬物血中濃度測定割合 (全国平均)	100.0% (89.5%)	81.5% (89.8%)	81.0% (91.5%)	81.0% (91.2%)	67.8% (92.4%)
薬剤管理指導実施割合(病棟薬剤業務実加算の無い医療機関) (全国平均)		45.7% (51.1%)	44.5% (48.8%)	41.9% (48.0%)	22.7% (47.6%)
アスピリン内服患者の退院時酸分泌抑制薬(PPI/H2RA)処方率 (全国平均)			84.9% (83.5%)	84.7% (83.5%)	84.6% (83.7%)

※ 全国平均は全国の病床数400床から499床までの同規模病院の値の平均である。